

# BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

SESSION 2017

## MATHÉMATIQUES

### SÉRIE S

Candidats ayant suivi l'enseignement de spécialité

Durée de l'épreuve : 4 heures – Coefficient : 9

Ce sujet comporte 7 pages numérotées de la page 1/7 à la page 7/7.

L'usage des calculatrices est autorisé selon les termes de la circulaire  
n° 99-186 du 16 novembre 1999.

\*.\*.\*.\*

**Le candidat doit traiter les quatre exercices.**

*Il est rappelé que la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront  
pour une part importante dans l'appréciation des copies.*

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL - Série S	SESSION 2017	
ÉPREUVE : MATHÉMATIQUES	SUJET	
17MASC11	Coefficient : 9	Page 1/7
	Durée : 4 heures	

**Exercice 1 (5 points)**  
**Commun à tous les candidats**

*Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM). Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses est exacte. Le candidat indiquera sur sa copie le numéro de la question et la lettre correspondant à la réponse exacte. Aucune justification n'est demandée. Une réponse exacte rapporte un point, une réponse fausse ou une absence de réponse ne rapportent aucun point.*

On étudie la production d'une usine qui fabrique des bonbons, conditionnés en sachets.

On choisit un sachet au hasard dans la production journalière. La masse de ce sachet, exprimée en gramme, est modélisée par une variable aléatoire  $X$  qui suit une loi normale d'espérance  $\mu = 175$ .

De plus, une observation statistique a montré que 2 % des sachets ont une masse inférieure ou égale à 170 g, ce qui se traduit dans le modèle considéré par :  $P(X \leq 170) = 0,02$ .

**Question 1 :** Quelle est la probabilité, arrondie au centième, de l'évènement « la masse du sachet est comprise entre 170 et 180 grammes » ?

**Réponse a :** 0,04

**Réponse b :** 0,96

**Réponse c :** 0,98

**Réponse d :** On ne peut pas répondre car il manque des données

Les différents bonbons présents dans les sachets sont tous enrobés d'une couche de cire comestible. Ce procédé, qui déforme certains bonbons, est effectué par deux machines A et B.

Lorsqu'il est produit par la machine A, la probabilité qu'un bonbon prélevé aléatoirement soit déformé est égale à 0,05.

**Question 2 :** Sur un échantillon aléatoire de 50 bonbons issus de la machine A, quelle est la probabilité, arrondie au centième, qu'au moins 2 bonbons soient déformés ?

**Réponse a :** 0,72

**Réponse b :** 0,28

**Réponse c :** 0,54

**Réponse d :** On ne peut pas répondre car il manque des données

La machine A produit un tiers des bonbons de l'usine. Le reste de la production est assuré par la machine B. Lorsqu'il est produit par la machine B, la probabilité qu'un bonbon prélevé aléatoirement soit déformé est égale à 0,02.

Dans un test de contrôle, on prélève au hasard un bonbon dans l'ensemble de la production. Celui-ci est déformé.

**Question 3 :** Quelle est la probabilité, arrondie au centième, qu'il soit produit par la machine B ?

**Réponse a :** 0,02

**Réponse b :** 0,67

**Réponse c :** 0,44

**Réponse d :** 0,01

La durée de vie de fonctionnement, exprimée en jour, d'une machine servant à l'enrobage, est modélisée par une variable aléatoire  $Y$  qui suit la loi exponentielle dont l'espérance est égale à 500 jours.

**Question 4 :** Quelle est la probabilité, arrondie au centième, que la durée de fonctionnement de la machine soit inférieure ou égale à 300 jours ?

**Réponse a :** 0,45

**Réponse b :** 1

**Réponse c :** 0,55

**Réponse d :** On ne peut pas répondre car il manque des données

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL - Série S	SESSION 2017	
ÉPREUVE : MATHÉMATIQUES	SUJET	
	Coefficient : 9	Page 2/7
17MASCSG11	Durée : 4 heures	

L'entreprise souhaite estimer la proportion de personnes de plus de 20 ans parmi ses clients, au niveau de confiance de 95 %, avec un intervalle d'amplitude inférieure à 0,05. Elle interroge pour cela un échantillon aléatoire de clients.

**Question 5 :** Quel est le nombre minimal de clients à interroger ?

Réponse a : 40

Réponse b : 400

Réponse c : 1600

Réponse d : 20

**Exercice 2 (4 points)**  
**Commun à tous les candidats**

L'espace est muni d'un repère orthonormé  $(O ; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ .

On considère deux droites  $d_1$  et  $d_2$  définies par les représentations paramétriques :

$$d_1 : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 3 - t \\ z = t \end{cases}, t \in \mathbf{R} \quad \text{et} \quad d_2 : \begin{cases} x = -5 + 2t' \\ y = -1 + t' \\ z = 5 \end{cases}, t' \in \mathbf{R}.$$

On admet que les droites  $d_1$  et  $d_2$  sont non coplanaires.

Le but de cet exercice est de déterminer, si elle existe, une troisième droite  $\Delta$  qui soit à la fois sécante avec les deux droites  $d_1$  et  $d_2$  et orthogonale à ces deux droites.

1. Vérifier que le point A (2 ; 3 ; 0) appartient à la droite  $d_1$ .
2. Donner un vecteur directeur  $\vec{u}_1$  de la droite  $d_1$  et un vecteur directeur  $\vec{u}_2$  de la droite  $d_2$ . Les droites  $d_1$  et  $d_2$  sont-elles parallèles ?
3. Vérifier que le vecteur  $\vec{v}(1 ; -2 ; -3)$  est orthogonal aux vecteurs  $\vec{u}_1$  et  $\vec{u}_2$ .
4. Soit  $P$  le plan passant par le point A, et dirigé par les vecteurs  $\vec{u}_1$  et  $\vec{v}$ .  
On étudie dans cette question l'intersection de la droite  $d_2$  et du plan  $P$ .
  - a) Montrer qu'une équation cartésienne du plan  $P$  est :  $5x + 4y - z - 22 = 0$ .
  - b) Montrer que la droite  $d_2$  coupe le plan  $P$  au point B (3 ; 3 ; 5).
5. On considère maintenant la droite  $\Delta$  dirigée par le vecteur  $\vec{v}(1 ; -2 ; -3)$ , et passant par le point B (3 ; 3 ; 5).
  - a) Donner une représentation paramétrique de cette droite  $\Delta$ .
  - b) Les droites  $d_1$  et  $\Delta$  sont-elles sécantes ? Justifier la réponse.
  - c) Expliquer pourquoi la droite  $\Delta$  répond au problème posé.

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL - Série S	SESSION 2017	
ÉPREUVE : MATHÉMATIQUES	SUJET	
	Coefficient : 9	Page 3/7
17MASCSSG11	Durée : 4 heures	

**Exercice 3 (6 points)**  
**Commun à tous les candidats**

La pharmacocinétique étudie l'évolution d'un médicament après son administration dans l'organisme, en mesurant sa concentration plasmatique, c'est-dire sa concentration dans le plasma. On étudie dans cet exercice l'évolution de la concentration plasmatique chez un patient d'une même dose de médicament, en envisageant différents modes d'administration.

**Partie A : administration par voie intraveineuse**

On note  $f(t)$  la concentration plasmatique, exprimée en microgramme par litre ( $\mu\text{g.L}^{-1}$ ), du médicament, au bout de  $t$  heures après administration par voie intraveineuse.

Le modèle mathématique est :  $f(t) = 20e^{-0,1t}$ , avec  $t \in [0, +\infty[$ .

La concentration plasmatique initiale du médicament est donc  $f(0) = 20 \mu\text{g.L}^{-1}$ .

1. La demi-vie du médicament est la durée (en heure) après laquelle la concentration plasmatique du médicament est égale à la moitié de la concentration initiale.

Déterminer cette demi-vie, notée  $t_{0,5}$ .

2. On estime que le médicament est éliminé dès que la concentration plasmatique est inférieure à  $0,2 \mu\text{g.L}^{-1}$ .

Déterminer le temps à partir duquel le médicament est éliminé. On donnera le résultat arrondi au dixième.

3. En pharmacocinétique, on appelle ASC (ou « aire sous la courbe »), en  $\mu\text{g.L}^{-1}.\text{h}$ , le nombre

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x f(t) dt.$$

Vérifier que pour ce modèle, l'ASC est égal à  $200 \mu\text{g.L}^{-1}.\text{h}$ .

**Partie B : administration par voie orale**

On note  $g(t)$  la concentration plasmatique du médicament, exprimée en microgramme par litre ( $\mu\text{g.L}^{-1}$ ), au bout de  $t$  heures après ingestion par voie orale.

Le modèle mathématique est :  $g(t) = 20(e^{-0,1t} - e^{-t})$ , avec  $t \in [0, +\infty[$ .

Dans ce cas, l'effet du médicament est retardé, puisque la concentration plasmatique initiale est égale à :  $g(0) = 0 \mu\text{g.L}^{-1}$ .

1. Démontrer que, pour tout  $t$  de l'intervalle  $[0, +\infty[$ , on a :  $g'(t) = 20e^{-t}(1 - 0,1e^{0,9t})$ .

2. Étudier les variations de la fonction  $g$  sur l'intervalle  $[0, +\infty[$ . (On ne demande pas la limite en  $+\infty$ .)

En déduire la durée après laquelle la concentration plasmatique du médicament est maximale. On donnera le résultat à la minute près.

**Partie C : administration répétée par voie intraveineuse**

On décide d'injecter à intervalles de temps réguliers la même dose de médicament par voie intraveineuse. L'intervalle de temps (en heure) entre deux injections est choisi égal à la demi-vie du médicament, c'est-à-dire au nombre  $t_{0,5}$  qui a été calculé en A-1.

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL - Série S	SESSION 2017	
ÉPREUVE : MATHÉMATIQUES	SUJET	
	Coefficient : 9	Page 4/7
17MASC SG11	Durée : 4 heures	

Chaque nouvelle injection entraîne une hausse de la concentration plasmatique de  $20 \mu\text{g.L}^{-1}$ .

On note  $u_n$  la concentration plasmatique du médicament immédiatement après la  $n$ -ième injection.

Ainsi,  $u_1 = 20$  et, pour tout entier  $n$  supérieur ou égal à 1, on a :  $u_{n+1} = 0,5u_n + 20$ .

On remarque qu'avec ce modèle, la concentration initiale du médicament après la première injection, soit  $20 \mu\text{g.L}^{-1}$ , est analogue à celle donnée par le modèle de la partie A, soit  $f(0)$ .

1. Démontrer par récurrence que, pour tout entier  $n \geq 1$  :  $u_n = 40 - 40 \times 0,5^n$ .
2. Déterminer la limite de la suite  $(u_n)$  lorsque  $n$  tend vers  $+\infty$ .
3. On considère que l'équilibre est atteint dès que la concentration plasmatique dépasse  $38 \mu\text{g.L}^{-1}$ . Déterminer le nombre minimal d'injections nécessaires pour atteindre cet équilibre.

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL - Série S		SESSION 2017	
ÉPREUVE : MATHÉMATIQUES		SUJET	
		Coefficient : 9	Page 5/7
17MASC11	Durée : 4 heures		


**Exercice 4 (5 points)**  
**Candidats ayant choisi la spécialité mathématique**

L'arbre de Stern-Brocot a été découvert séparément par le mathématicien allemand Moritz Abraham Stern (1858) et par Achille Brocot (1861), horloger français qui l'a utilisé pour concevoir des systèmes d'engrenages avec un rapport entre rouages proche d'une valeur souhaitée.

Cet exercice aborde la méthode avec des matrices carrées.


On considère les deux matrices  $G = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$  et  $D = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

On construit un arbre descendant à partir d'une matrice initiale, de la façon suivante : de chaque matrice carrée  $M$  de l'arbre partent deux nouvelles branches vers les deux autres matrices  $M \times G$  (à gauche) et  $M \times D$  (à droite). Ces deux nouvelles matrices sont appelées les matrices filles de  $M$ .



Dans la méthode considérée, on prend comme matrice initiale la matrice  $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

- Déterminer les deux matrices manquantes  $A$  et  $B$ , dans la troisième ligne de l'arbre de Stern-Brocot ci-dessous.



Dans la suite de l'exercice, on admet que pour toute matrice  $M = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$  de l'arbre de Stern-Brocot, les nombres  $a, b, c, d$  sont des entiers vérifiant :  $b + d \neq 0$ .

- On associe à une matrice  $M = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$  de l'arbre de Stern-Brocot la fraction  $\frac{a+c}{b+d}$ . Montrer que, dans cette association, le trajet « gauche-droite-gauche » à partir de la matrice initiale dans l'arbre, aboutit à une matrice correspondant à la fraction  $\frac{3}{5}$ .

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL - Série S		SESSION 2017	
ÉPREUVE : MATHÉMATIQUES		SUJET	
		Coefficient : 9	Page 6/7
17MASC SG11		Durée : 4 heures	

3. Soit  $M = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$  une matrice de l'arbre. On rappelle que  $a, b, c, d$  sont des entiers.

On note  $\Delta_M = ad - bc$ , la différence des produits diagonaux de cette matrice.

a) Montrer que si  $ad - bc = 1$ , alors  $d(a + c) - c(b + d) = 1$ .

b) En déduire que si  $M = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$  est une matrice de l'arbre de Stern-Brocot telle que

$\Delta_M = ad - bc = 1$ , alors  $\Delta_{M \times G} = 1$ , c'est-à-dire que la différence des produits diagonaux de la matrice  $M \times G$  est aussi égale à 1.

On admet de même que  $\Delta_{M \times D} = 1$ , et que toutes les autres matrices  $N$  de l'arbre de Stern-Brocot vérifient l'égalité  $\Delta_N = 1$ .

4. Déduire de la question précédente que toute fraction associée à une matrice de l'arbre de Stern-Brocot est irréductible.

5. Soit  $m$  et  $n$  deux entiers naturels non nuls premiers entre eux. Ainsi la fraction  $\frac{m}{n}$  est irréductible. On considère l'algorithme suivant.

VARIABLES :  $m$  et  $n$  sont des entiers naturels non nuls et premiers entre eux

TRAITEMENT : Tant que  $m \neq n$ , faire

Si  $m < n$

Afficher « Gauche »

$n$  prend la valeur  $n - m$

Sinon

Afficher « Droite »

$m$  prend la valeur  $m - n$

- a) Recopier et compléter le tableau suivant, indiquer ce qu'affiche l'algorithme lorsqu'on le fait fonctionner avec les valeurs  $m = 4$  et  $n = 7$ .

Affichage		Gauche	...	...	...
$m$	4	...	...	...	...
$n$	7	...	...	...	...

- b) Conjecturer le rôle de cet algorithme. Vérifier par un calcul matriciel le résultat fourni avec les valeurs  $m = 4$  et  $n = 7$ .

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL - Série S		SESSION 2017	
ÉPREUVE : MATHÉMATIQUES		SUJET	
17MASC SG11		Coefficient : 9	Page 7/7
		Durée : 4 heures	

